8

Mr. braillard chirurgien
de lille comtat d'avignon

ayant reconnu par le mauvais succès qu'eut une operation faitte a un marchand de filoselle de cavaillon d'une hernie inguinale enteroepiplocele complette, dans la quelle apprés avoir manoeuvré en conformité de la pratique communement admise par nos meilleurs autheurs, qui est apprés la reduction du boyau couper l'epiploön compris dans la hernie audessous de la ligature. cette pratique dis je ayant mal reussi quoyque l'operation fut tres bien faitte d'ailleurs, m'ettant trouvé dans deux cas d'hernies de la mesme nature par leur ancieneté et le volume enorme d'epiploön sorti, je me suis comporté de la maniere qui suit, et qui m'a tres bien reussi.

le 23.e jour du mois de feuvrier 1744 je fus appellé de bedoüin pour faire l'operation de la hernie crurale a un religieux dominiquain agé de soixante et quelques années, d'un temperament assés bon, le religieux portoit depuis plus de vingt ans cette hernie du coté droit, dont la grosseur, et la longeur, etoit si considerable, qu'elle alloit jusques a la partie moyene de la cuisse, la tumeur etant comme partagée en deux par un etranglement du sac herniaire imitant assés bien la figure d'une courge, elle nous parut tres profonde, et tres adherante, ce qui nous fit beaucoup craindre pour le succés de l'operation: le bon religieux appliquoit soigneusement tous les jours un bandage sur sa tumeur, sans se mettre en paine de la reduire et croyoit avec cette manoeuvre la contenir et empescher des suittes facheuses. cette methode continuée plusieurs années ne produisit tout au plus au malade que quelques legers simptomes, cela nous fit croire que l'epiploön seul avoit fait jusques alors la hernie et que le boyau s'etant ensuite glissé, et souffrant etranglement, causoit conjointement avec l'epiploön tous les simptomes qui devinrent si pressants qui nous obligerent a l'operation.

ARC 16 d.3 n°92 15 p. 1

+

latumeur etant ouverte, enpresence de mr. jarlier medecin de laville de maran, de mr. ~~gui~~ guyhon eltre chirurgien de carpentras, de mrs talene pere et fils, chirurgiens delaville de Bedoüin et autres chirurgiens dudit lieu. je decouvris le gros volume depiploön d'une substance charnüe, et comme carcinomateuse, cause du sejour des liqueurs par la compression des vaisseaux. ayant detruit toutes les adherances inseparables aux anciennes hernies par les frequentes inflammations quelles ont souffert, je soulevay cette grosse masse, et nous trouvames par dessous une portion du boyeau deja un peu livide, qui contenoit des matieres fecales endurcies, et arrondies comme deux grosses noix. lequi m'obligea de couper non seulement le ligament de falloppe, mais d'anticiper encore sur le corps des muscles, pour parvenir a son intromission. cette incision me fut favorable, et me donna du jour pour parvenir a detruire toutes les adherances delepiploön, non seulement avec le sac herniaire mais encore avec le ligament, je coupay ensuite le gros volume depiploön sorti, et je l'abandonay dans le ventre sans luy faire la moindre ligature... cette pratique ne fut suivie d'aucun mauvais simptome, les accidents diminuerent dabort le ventre baissa, le malade fut a la selle, le vomissement et la fievre cesserent et l'operation eut tout le succes que nous pouvions souhaiter...

si cette façon d'introduire ou pour mieux dire d'abandonner dans le ventre lepiploön sans ligature souffre des difficultes, et nous puisse faire craindre pour les suittes, ce n'est que du coté des epanchements qui peuvent s'ensuivre des vaisseaux coupés; mais si l'on fait attantion qu'en relachant l'epiploön par son introduction dans le ventre sans ligature, on na plus a craindre des tiraillements a l'esthomac, ou il est attaché, et que cette ligature qui devient pour lors un etranglement encore plus considerable, ocasionne

ces irritations et des reflux desprits, qui sont bientost suivis
dinflammation, et dalteration non seulement a cette partie mais
encore aux parties interieures du bas ventre. voila ce qui
nous arriva au malade de lauaillon; dailleurs les accidents
ne peuuent ils pas etre dependants de letranglement de
lintestin et du tiraillement que cause lepiploon a lesthomac
surtout dans les hernies ou il y a une quantité considerable
depiploon sorti, dont ~~la~~ linflammation deja contractée, par
une gene dans le cours des fluides, peut rendre lepiploon
egalement cause des simptomes, lexemple de loperation
suivante confirmera encore mes reflexions.

Une marchande de notre ville agée de ~~trente~~ quarante cinq ans dun
assés bon temperament portoit depuis neuf a dix ans une hernie
crurale de la grosseur de la teste dun petit enfant un peu oblongue
elle appliquoit sur cette tumeur un bandage qui ne laissoit pas de
permettre a lintestin de sortir, ce qui faisoit que la malade
ressentoit de tems en tems des douleurs de colique de tiraillement
a lesthomac et des vomissements dont elle etoit delivrée par
des saignées, et des cataplasmes. il luy survint le quatre de
ce present mois un etranglement si considerable que non
obstant les saignées, les cataplasmes et autres tentatives les
accidents devinrent si pressants quelle vomissoit les matieres
fecales, je luy fis loperation le mesme jour en presence de
mr chambaud son medecin, et mrs rissy pere et fils. ayant
ouvert la tumeur et detruit toutes les adherances nous trouuames
sous le gros volume depiploon une portion dintestin que je
reduisis dans un instant apprés la dilatation du ligament,
je coupay ensuite tout cet epiploon sorti, et lintroduisis dans
le ventre sans aucune ligature et pansay ensuite la malade
tous les simptomes cesserent apprés loperation, et lheureuse
suites suivit nos souhaits, et la malade est guerie
radicalement, ne la pansant plus quà ce

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

o. ||||

n. ||||||||